

Mémoire sur l'usage du
 forceps courbe, tiré d'expérience et
 d'observations pratiques, contre la section
 de la symphyse des os Pubis: Par M.
 NOLLESON, fils, Correspondant de l'Académie
 Royale de Chirurgie. à Vitry-le-François.



Si les diverses circonstances, plus ou moins
 fâcheuses qu'offre la pratique des
 accouchements, étoient saisies sous le véritable
 point de vue qu'elles présentent, les accoucheurs
 qui aiment le bien de l'humanité et honneur
 de l'art, seroient moins enthousiasmés
 et s'attacheroient à une pratique solide
 et éclairée, digne du point de perfection auquel
 l'Académie Royale de Chirurgie cherche à porter
 cette branche de l'art utile à la Population.

L'accueil distingué que mes premières
 observations sur l'usage du forceps courbe,
 ont reçu de cette illustre Compagnie, me

fait espérer qu'elles participeront à ses vœux
de bien-faisance : C'est ce qui m'engage aujourd'hui
à lui en offrir encore quelques autres avec des
recherches et des expériences relatives à ce
point de doctrine ? puissent ces observations,
contribuer à des travaux, d'autant plus pres-
sante, qu'ils détruiront des préjugés, des
moiens insuffisants, capiteux ou dangereux
qu'on a cherché à substituer au forceps Courbe,
dont l'utilité et les avantages semblent se
développer et se propager tous les jours dans la
pratique éclairée des accoucheurs, pour
anéantir un procédé contraire à la méthode
quelques règles de l'art, de justes combinaisons,
l'adresse et l'intelligence doivent faire adopter
exclusivement.

Dans le nombre de ces observations il y en a
une qui me paroît susceptible de réflexion sur
la construction du forceps Courbe. L'expérience
vient de m'apprendre que dans certains cas,
il faudroit que cet instrument salutaire
eût des branches un peu plus grandes
pour aller plus aisément chercher le fœtus au dessus
du détroit supérieur du bassin ; C'est-à-dire que l'espace qui se

trouve depuis le point de jonction des deux branches jumelles, jusqu'au commencement de sa serre, au lieu d'avoir trois pouces ou environ, en eût quatre et demi, sans rien changer à sa courbure n'y au reste de ses proportions. L'instrument ainsi construit pourroit être désigné sous le nom de grande forceps courbe et l'autre de petits forceps. Cet allongement d'ailleurs ne lui feroit rien perdre de sa force nécessaire pour faire l'extraction de l'enfant; au contraire il auroit un avantage de plus, et seroit employé avec beaucoup plus de succès et de certitude, dans ces cas particuliers où le sommet de la tête de l'enfant auroit une base contre nature, ou prodigieusement grosse et ne pourroit franchir le détroit supérieur du bassin.

Dans les expériences que j'ai faites, j'ai essayé sur des fantômes, dont les têtes étoient de cette construction et appuyées sur le détroit du petit bassin, un forceps de cette correction, quoique



18
Construit par un Serrurier; et j'ai parfaitement
bien réussi à les extraire. J'avois senti
l'utilité d'un pareil instrument dans
l'accouchement qui fait le sujet de la
première de mes observations, que j'ai
l'honneur d'offrir à l'Académie. On y
Verra que ce n'est pas sans peine que j'ai
terminé cet accouchement avec le forceps
courbe ordinaire; et que dans ce fait
de pratique j'ai dû sentir la nécessité
de cette correction, surtout encore, lorsque
les accidents pour les quels je désirerois
un forceps. De cette nouvelle construction
se trouvent jointe à une constitution
grasse et replette, où la jonction des
branches du forceps ordinaire, après la
tête de l'enfant saisie, se trouve quelquefois
dans l'intérieur du vagin, et non hors de
la vulve où elle doit être absolument
pour opérer aisément sans obstacle,
et rendre l'opération certaine et digne
des éloges que mérite le forceps conduit
par des mains habiles et intelligentes.

1.^{re} observation. J'fus appelé à vitri-en-perthuis le 12 g.^{bre}
de l'année dernière 1779 pour soulager la
femme d'un homme fery vigneron au distict
laquelle étoit en travail d'enfant depuis
48 heures. Cette femme âgée d'environ 26-
ans pouvoit avoir 4 pieds 2 pouces de hauteur,
ayant les jambes et les cuisses fort grosses et
marchans mal. L'épaule Droite étoit
saillante. elle avoit le teint plombé et
vermineux. M. Guillemain, mon confrère,
qui l'avoit accouchée précédemment de
deux enfans morts, n'avoit pu les
extraire que par les pieds; et encore l'un
des deux fut-il mutilé. La tête séparée
de son corps resta au dessus du détroit
supérieur du bassin; et M. Guillemain
eut mille peines d'en faire l'extraction,
quoiqu'il en eut ôté la cervelle préalable-
ment. Le diamètre antérieur du bassin
de cette femme à la vérité n'avoit que trois
pouces, mesuré comme s'il eut été
décharné. La première vertèbre des
lombes qui s'articule avec le sacrum,
étoit arquée en devant et se rapprochoit



Considérablement de l'axe du petit bassin.
la jonction des os pubis par leur symphyse,
qui rétrécissoit d'un grand ponce le petit
diamètre du bassin, n'empêchoit pas que
le corps de ces os, vers leur base et à leur
jonction avec la cavité cotyloïde, ne
fussent assez évasés. Les os des Iles
qui forment la partie latérale du
grand bassin se portent plus en devant;
et la convexité de l'os sacrum beaucoup
plus en arrière. Le reste des parties
osseuses qui constituent le bassin étoit à
très peu de chose près dans l'état naturel (a).
après avoir touché cette femme, je reconnus
que le Cas que osseux qui se présenteoit
paroissoit s'allonger un peu dans le
détroit supérieur du petit bassin. Le cuir
chevelu étoit mollassé et indiquoit la
mort de l'enfant qui fut bientôt confirmée

(a) Ces remarques ont été faites sur le sujet même, en
présence de MM. Paquet et Malthieux chirurgiens
à l'ouverture du cadavre de cette femme morte environ
50 jours après son accouchement, d'un dépôt lactéux
consecutif formé au col, et dont la délitescence s'en
faisoit sur les viscères de la poitrine pour n'avoir pas été
ouvert assez tôt.

par la sortie du cordon ombilical,
Déjà flétri et sans pulsation. Je prévins
les assistants que l'Étroitesse du bassin
avoit été la cause de la mort de deux
premiers enfans qu'on avoit voulu
extraire sans le forceps; et que celui-ci devoit
la sienne à la sortie spontanée du cordon
ombilical depuis 26 heures, et peut-être à la
compression qu'il avoit soufferte par la tête
de l'enfant qui pressoit sur le Déroit
supérieur du bassin. Je proposai pour
terminer cet accouchement, l'application
du forceps courbe dont je m'étois
munir; et la femme bien disposée
à cette opération, j'introduisis les deux
branches du forceps; et lors que j'eus cru
avoir saisi la tête de l'enfant, j'exécutai
tous les différents mouvemens combinés
pour en faire l'extraction. Mais
toutes ces manoeuvres étoient
infructueuses. L'instrument se étoit
à chaque fois que je paroissois



augmenter la force d'extraction : et après
l'avoir introduit plusieurs fois, je jugeai
que ses branches n'étoient point assez
grandes pour aller chercher au-dessus du
Déroit Supérieur du Bassin, une tête
singulièrement allongée et qu'il falloit
cependant saisir dans des proportions
combinaées avec le forceps, pour lui faire
franchir le Déroit du Bassin. En effet,
lorsque j'avois introduit une seule branche
avec laquelle il paroissoit que j'avois
embrassé la tête dans son vrai point de
combinaison avec l'instrument, le lieu de
la jonction avec l'autre branche, se
trouvoit enfoncé de plus d'un ponce et demi
dans le vagin ; et lorsque j'introduisois
l'autre à la même profondeur pour
rendre les Jumeaux parallèles
et pouvois les joindre, après, la tête
saisie, je ne pouvois y réussir. Mais
cependant à force de secousses que je
donnai à la tête de l'enfant
logée au-dessus du Déroit

Supérieur du bassin, en appuyant sur
cette tête les deux branches du forceps que
je tenois aux deux mains, l'une de chaque
côté sans avoir pu les croiser, j'arrivai
à la faire avancer d'environ un pouce
dans le bassin. C'est alors que je profitai
de cet instant favorable pour mettre les
branches du forceps dans leur état de
jonction; et à l'aide de différents mouvements
de droite à gauche et en tournant la
face un peu de côté dans le diamètre
latéral, j'amenai dans le petit bassin
la tête que j'avois saisie cette dernière
fois dans ses proportions, alors
j'achevai, sans aucun danger pour
la mère, de faire l'extraction d'un enfant
mâle qui avoit une tête monstrueuse
et dont voici la description.



N^o la fontanelle à quelque chose près,
étoit dans l'état naturel; mais le
casque osseux postérieurement près,
étoit allongé de près de deux pouces

de plus qu'il ne porte ordinairement.

2.^o la base du crâne étoit fort large et le petit diamètre de la tête; c'est-à-dire la ligne qui la partage d'une bosse pariétale à l'autre, avoit 4 pouces 9 lignes au lieu de 3 à 4 pouces au plus qu'il doit avoir dans l'état ordinaire d'une bonne conformation.

3.^o Le grand diamètre de la tête pris depuis la symphyse du menton jusqu'à la partie postérieure et supérieure du Casque osseux avoit 7 pouces 10 lignes, tandis qu'il ne doit avoir que 5 pouces et demi ou 6 pouces dans les plus grosses têtes.

4.^o Tout le dessus du sommet de la tête qui répond à la base qui s'articule avec la première vertèbre du col étoit un peu évasé avec des inégalités, surtout vers le Regma. il représentoit, après près, cette partie en bonnet jésuitique.

5.^o les yeux étoient ronds, gros et saillants; les arcades sourcilières élevées. le nez manquoit, et la bouche qui formoit un bec de lièvre et laissoit entrevoir les os du palais qui manquoient en partie.

enfin cette tête monstrueusement conformée
étoit appuyée sur le Détroit Supérieur d'un bassin
vieil, de manière que la partie supérieure
et antérieure du coronal étoit accrochée d'un
côté sur la saillie que faisoit les sacrum avec la
première vertèbre lombaire; et la partie supérieure
de l'occipital qui forme la base du crâne étoit
retenue par les os pubis, en sorte qu'il n'y avoit
dans le bassin qu'une petite portion allongée
du Casque osseux.

D'après le détail anatomique de la conforma-
-tion vicieuse de cette tête et des os du bassin de
la femme, il n'est pas surprenant de voir que
le forceps courbe, n'ait pu saisir d'abord la
tête de cet enfant, de manière que les extrémités
des pinces ayent pu être portées jusqu'aux
parties moyennes de la mâchoire inférieure,
comme cela doit s'opérer dans tous les autres
cas possibles, puisque cette tête portoit
dans sa longueur 7 pouces 10 lignes, et que
les branches du forceps, n'en ont pas d'avant-
-age, mesurées depuis le commencement
de leur jonction. et les pièces qui servent



à assujettir les branches, lorsqu'elles étoient
croisées, se trouvoient enfoncées dans l'intérieur
du vagin, comme je l'ai déjà dit, lorsque je
saisissois la tête de l'enfant dans ses véritables
proportions : Mais lorsque je ne portois
pas les branches du forceps assez loin, et que
celles de leur jonction se trouvoient au bord de
la vulve, alors chaque extrémité des ferres ne
pouvoit être portée qu'un peu au delà de
oreilles de l'enfant ; et ne pouvant de cette
manière saisir le petit diamètre de la tête
dans ses véritables proportions combinées
avec le forceps, ses branches glissoient
nécessairement à la moindre force d'extraction,
ce qui rendoit mes premières tentatives
infructueuses.

C'est d'après toutes ces différentes manières
= 47 = de voir qui nous cependant réussit, quoi qu'avec
difficulté, que j'ai conçu la nécessité d'un forceps
allongé de environ deux pouces, depuis son point
de jonction, jusqu'au commencement de ses
serres, pour être employé plus utilement

et plus aisément en pareille occurrence; et dans
tous les autres cas, où une femme est souvent
très grosse, avec une matrice déviée anté-
rieurement sur les os pubis, dans la quelle
l'application de l'instrument double brancher
sous moins grande, devient plus ou moins
difficile, et peut même jusqu'à un certain
point.

M. Leves qui mérite tant d'éloges dans
l'art de l'accouchement, et l'Académie
qui s'en occupe essentiellement, ne peuvent
me savoir mauvais gré, José le père, de
faire par de nouvelles réflexions sur le forceps
Courbe relativement au nombre de cas. Cet
instrument modifié pour les cas extraordinaires,
de la nature de ceux que j'ai déterminés, et
sans modification pour les autres cas,
conciliera toujours à son auteur respectable
l'estime générale et la reconnaissance de
tous les accoucheurs instruits qui aiment
le bien de l'humanité. Son application
judicieusement faite dans presque toutes
les circonstances qui présentent de de



Difficultés, soit du côté de la Mère, soit du
côté de l'enfant, éloignera, sans contredit,
et bannira bientôt, toutes les méthodes
absurdes qu'on a voulu lui substituer
croiant enrichir l'art. L'observation suivante
démontrera encore à priori l'utilité du
forceps pour terminer un accouchement
dans le cas d'un bassin étroitement conforme
dont l'enfant est venu par les pieds et la
tête restée au dessus du détroit supérieur
du bassin, ne pouvant absolument le franchir
en raison discordante de son volume avec
les différents diamètres qui composent
le bassin.

2^{ème} observation. Lamir du 8 au 9 8^{bre} dernier
le nommé Maugin demeurant à St. Etienne
les Vîtri-en-perthois, me fit appeler pour
délivrer la femme, qui depuis 24 ou 30
heures étoit en travail de son premier enfant.
Celle femme est âgée de 42 ans: elle est d'une
Constitution replette et d'environ 4 pieds 3
pouces de hauteur. Une sage-femme du

lieu qui à suivi pendant deux années mes
Cours d'accouchement, instruisit que les
eaux s'étoient écoulées prématurément, et
qu'il y avoit quinze heures que l'enfant
présentoit le bras: quelle avoit essayé de
porter la main dans la Matrice, mais
que ses violentes Contractions et l'Étroit-
=tasse du bassin, l'en avoient absolument
empêché. Je reconnus les Choses telles que cette
Mâtrone intelligente les annonçoit; et
comme l'orifice de la Matrice étoit alors
Suffisamment effacé pour permettre l'accouche-
=ment, Je me hâtai d'y procéder. Lorsque
J'eus introduit ma main gauche dans la
matrice, avec toute la peine possible, pour
aller chercher le pied de l'enfant logé
dans l'acavité de Sileum du côté gauche,
à peine un pied et ma main, qui, certainement
n'est pas grosse, purent-ils se tirer ensemble;
cela me fit craindre que lorsque la tête
viendrait pour franchir le bassin, j'aurois
beaucoup de peine à l'extraire. En effet,



quand les deux pieds furent amenés, le corps
sortit, et les deux bras dégagés, j'e trouvai
la résistance à laquelle je m'attendais. Je
fis néanmoins toutes les tentatives possibles
pour dégager cette tête arrêtée au dessus du
détroit supérieur du bassin; mais je ne pour
y réussir, quoique deux doigts de main
gauche fussent appliqués derrière l'occipital
de l'enfant, dessous l'arcade pubis, et le doigt
index de la main droite dans sa bouche,
légèrement appuyé sur la mâchoire inférieure
afin que par un mouvement combiné, je
pusse faire faire à la tête la Culbute et
l'amener dans le petit bassin en dirigeant
la face un peu latéralement vers la symphyse
Sacro-iliaque droite, pour éviter la saillie
de la partie supérieure de l'os pubis qui se
rapprochoit de l'axe du bassin, et la tirer
enfin au dehors, suivant cette direction et
ma méthode ordinaire en pareille
occurrence, mais cette résistance invincible
me conduisit à la recherche des dimensions

Dubassin qui je croiois mal conformé. Je
remarquai en effet que la base du fons de
l'enfant étoit fortement acrochée sur la partie
supérieure de l'os sacrum qui faisoit faillie en
dedans du bassin; et l'occipital sur l'arcade
de l'os pubis un peu aplati et vice versa.
Le diamètre antérieur paroissoit avoir moins
de trois pouces, à peu près mesurés sur un
bassin décharné. Le forceps courbe qui ne
me quitta jamais lorsque je suis appelé en
campagne pour faire des accouchements, me
fut d'une grande ressource dans cette cir-
-constance. J'en fis l'introduction, après avoir
confié le corps de l'enfant à la sage-femme,
qui le tenoit un peu relevé pour faciliter mon
opération. Le forceps fut enfin appliqué sur
la tête de l'enfant, de manière que son petit
diamètre se trouvoit exactement logé dans
la concavité de deux os, en sorte qu'en
tirant la tête, ainsi saisie, et en lui faisant
faire un mouvement de rotation de gauche
à droite de la mère, en dirigeant la face un
peu de côté, je suis parvenu à la faire avancer.



Dans le petit bassin et enfui à tirer au dehors
un enfant du sexe masculin bien constitué,
qui donna la plus grande figure d'enfant, mais
qui avoit une petite dépression aux téguments
du fion, qui a été parfaitement guérie par
l'application d'une Compresse trempée dans
l'eau marine; et la mère a été parfaitement
rétablie en quinze jours.

Ce fait d'expérience démontre sans
doute la possibilité possible d'extraire
d'un bassin mal conformé, un enfant dont les
pieds et le corps seroient sortis les premiers, et
la tête accrochée au dessus du détroit supérieur
du bassin. Si M. Sigault qui a conseillé
gratuitement et même exécuté la section
de la symphyse des os pubis à la femme Souetot,
après avoir eu pareil cas, avoit suivi ce
procédé opératoire, la femme Souetot n'eût
pas été opérée; et de cette manière pouvoit
avoir des enfants vivans dans ses premières
Couches. M. Sigault ne cherchoit plus
encore à soutenir opiniâtement contre les
règles de l'art et les faits d'expérience, que

Le produit de deux lignes ou environ, dont le
diamètre antérieur du bassin peut être aug-
menté par l'écartement forcé d'un pouce
et demi ou environ, que peut donner la section
de la symphyse des os pubis; que ce produit,
dis-je, est suffisant pour faciliter l'émission
de la tête d'un enfant, dans le cas où son volume
seroit trop gros, ou les os du bassin trop étroits.

Cette observation prouve encore d'une
manière convaincante que la force auxiliaire
donnée par le forceps courbe, équivalant dans
un bassin mal conformé à une ampliation
suffisante pour laisser passer la tête de l'enfant,
qu'on chercheroit en vain à lui donner par la
section de la symphyse, abstraction faite des
accidents graves et multipliés dont elle peut
être susceptible en suivant le procédé de M.
Sigault. une observation que je vais rapporter,
quoique faite sur un cadavre, mais frais, et
avec un fantôme imitatif de la nature, peut
justifier de cette assertion.



2^e Observation. Une pauvre fille nommée Marie
Dollé fileuse de coton en cette ville, âgée —

d'environ 27 ans, d'une Stature hideuse, boitant,
bossue et de hauteur d'environ 3 pieds 10 pouces,
est morte à la suite d'une Cachexie le 27 avril
dernier. Je demandai l'ouverture du Cadavre à son
frère qui me l'octroya. Mon intention étoit moins
de chercher la cause de sa mort, trop connue,
que de mesurer si les os du bassin étoient
réellement mal conformés, comme je le présu-
= moin, et de faire les expériences que je
projettois depuis long-temps. après l'ouverture
du bas-ventre, les viscères et le vagin enlevés,
Je mesurai le bassin dans tous ses sens; et voici
ce que j'y ay remarqué.

1.^o Les trois premières vertèbres qui suivent
l'os sacrum, se portoient vers l'ileum gauche
en arcuant un peu en dedans du bassin, ce
qui faisoit que la partie supérieure de l'os
sacrum très peu courbe s'inclinoit du
même côté.

2.^o L'ileum droit avoit 4 pouces 10 lignes, —
mesuré depuis son épine antérieure et supé-
= rieure, jusqu'à la symphyse sacro-iliacque;
et l'ileum gauche ne étoit à cet endroit
que 2 pouces 3 lignes.

3.^o les os pubis aplatis et vice versa —

rétrécissant le Diamètre antérieur du bassin,
de manière qu'il n'avoit que 2 pouces 10 lignes,
mesuré comme s'il eut été décharné.

1.^o le Diamètre latéral qui étoit moins
évasé du côté gauche portoit 5 pouces 9 lignes.

5.^o les tubérosités de l'ischium étoient
allongées et très minces; et leurs épines
très peu saillantes en dedans du bassin de
même que le Coccyx; en sorte que le Détroit
inférieur étoit très grand et pouvoit permettre
aisément la sortie de la tête du plus gros
enfant.

Après avoir examiné et pris les dimensions
de ce bassin, J'eus les expériences dont voici
le résultat.

J'eus un fantôme qui serv à mes
démonstrations pratiques et dont la tête et
toutes les parties du corps sont faites en
Carton préparé, et artistement arrangées par
un Chirurgien mécaniste: elles sont recouvertes
de peau d'âne et polie; et le fantôme est si
conforme à un enfant de grosseur et longueur
ordinaire et à terme, qu'on s'y méprendroit
sans la Nature en bien imitée en toutes ses
parties et dans son articulation mobiles.
Je posai cet enfant imitatif dans le bassin,



le corps et les bras dégagés; et la tête arrêtée au dessus
du détroit supérieur, la face en dessous. J'essayai de dégager
la tête selon ma méthode ordinaire, dont j'ai parlé
cy devant. mes tentatives furent répétées plusieurs
fois sans succès. Je fus donc obligé d'avoir recours
au forceps courbe que j'introduisis et appliquai
de nouveau que pour faire l'accouchement qui fit
le sujet de ma deuxième Observation. J'ai eu par
ce moyen la satisfaction de triompher bientôt
de l'obstacle qui opposoit à la sortie de la tête
de l'enfant, le vice des os du bassin.

Il faut observer encore icy que la tête de ce
fantôme, quoique creusée et ayant une fonta-
= nelle et des parietaux un peu flexibles,
ne peut néanmoins prétendre comme le seroit une
tête naturelle en pareille occurrence: Ce qui me
fait conclure que tous bassins semblablement
viciés permettront toujours l'extraction d'un
enfant à terme, lorsqu'on emploiera avec
adresse le forceps courbe.

Cette première expérience finie, je replaçai
mon fantôme de la même manière, et ne pouvant
même l'extraire, après plusieurs tentatives,
sans le secours du forceps, j'oubliai pour un
instant ses avantages; Je menai à la place
de M. Sigault et je procédai sans miséricorde.

à la section de la symphyse. Cette opération m'a
donné environ 3 à 4 lignes d'écartement spontanée
et au moins de deux aides, M. M. Malthieu et Mon
Elève, nous avons tâché de nous procurer
l'écartement désiré par M. Sigault, mais nous
n'eûmes jamais le portoir au delà d'un pouce
dix lignes. après cet écartement forcé et
diabolique à-t-il donné au diamètre antérieur
du bassin quelque chose de plus. la femme souffroit
patiemment cette opération : mais je crois bien
que si elle eût été vivante, elle eût souffert le
martir, par les violentes tensions des ligaments
sacro-ischiatiques, les disruptions des symphises
sacro-iliaques et les dislocations qu'en pareil
cas, on ne peut manquer d'occasionner sur le col
de la vessie, l'urètre et sur toutes les parties
molles environnantes, dont les fibres en tout
état de cause, ne pourroient jamais être que très
faibles.

après la section de la symphyse j'essayai
par différentes reprises d'extraire le fœtus et de
dégager la tête, dont la base du front portoit sur
la partie supérieure de l'os sacrum qui la retenoit,
et l'occipital sur les pubis séparés. mais
je n'en vins pas à mon honneur, et si j'eusse



insiste plus long-temps, j'aurois arraché la tête
à mon fantôme. Je fus donc obligé pour terminer
cet accouchement supposé de recourir au
forceps; et j'ai remarqué que j'avois trouvé plus
de difficultés dans l'extraction de la tête
du fantôme, que la première fois que je la
dégageai de ce bassin; c'est-à-dire, avant que
je fisse la section de la symphyse. or j'ai cru
devoir attribuer ce petit obstacle aux deux pubis,
qui, étant écartés l'un de l'autre pressent par leurs
angles l'occipital qui s'y logeait et par conséquent
opposaient plus de résistance à l'extraction de
l'enfant, surtout quand on forceit l'écartement
spontané).

L'academie à laquelle j'ai l'honneur d'offrir
mes observations et mes recherches, pourra,
si elle le juge à propos, se faire rendre compte
de ces résultats sur des bassins viciés
soit avec des fantômes bien faits, soit
avec des enfants morts-nés, qu'on peut
se procurer plus aisément à Paris qu'ailleurs;
elle verra qu'il n'avance rien que de conforme à la
vérité, et que l'art doit gagner beaucoup

au fruit de mes expériences.

On ne conceit pas d'ailleurs comment la femme soustraite en a été guérie pour une claudication et une fistule urinaire, si véritablement l'écartement du pubis a été porté à deux pouces et demi, non par spontanéité comme l'articule M. Sigault dans son Mémoire du aux assemblées de la faculté de Médecine les 3 et 6 bre 1777, ce qui est de toute impossibilité, mais bien forcé dans la rigueur d'utérus: et cet écartement forcé qui devient nécessairement la source des accidents fâcheux, toute une semblable opération doit être suivie.

L'expérience démontre évidemment que le forceps Courbe, quoiqu'en dise M. Sigault et ses partisans, sera toujours le moyen qui suppléera à toute autre Méthode insuffisante et dangereuse, pour terminer les accouchements dans le bassin mal conformé, exceptés dans ces cas rares, où il y aura impossibilité absolue que l'instrument estalé de l'enfant puissent sortir ensemble: ce qui ne pourroit arriver que par une diminution considérable du diamètre.



latéral du bassin. Mais ce cas particulier
doit être si rare, qu'on ne doit pas même
s'en douter: car plus les bassins sont viciés,
et le diamètre antérieur diminué, plus vous
trouvez le diamètre latéral, ne l'être, qu'en
proportion, point d'autant, ou plus étendu,
ainsi que mes observations et mes recherches
le démontrent manifestement. Mais en
supposant ce phénomène de la Nature,
ou plutôt cette différence monstrueuse,
Je réfère à l'Académie de prononcer sur
les moyens que le véritable art prescrit
dans ces occurrences fâcheuses.

Au surplus dans l'accouchement naturel
où la tête de l'enfant se présente dans une
bonne situation, mais qui en raison de
son volume, ou de l'étroitesse du bassin
de la mère, ne peut le franchir, et où il y a
souvent toute impossibilité de retourner
l'enfant, soit à cause des violentes et
successives contractions de la Matrice, soit
à cause de l'enclavement d'une tête, qui
d'ailleurs peut être très allongée et mal-

4^{eme} Observation. Le S^r Thomassin bourgeois
demeurant en cette ville rue St. Jacques, me
fit appeler l'anné du 22 au 23 juillet
de la présente année 1780, pour voir sa femme
en travail d'enfant auprès de laquelle étoit
une sage-femme et un homme confière, dont

le mérite n'est point d'être accoucheur. Cette
femme âgée d'environ 36 ans, ayant quatre
pieds 2 pouces de hauteur, les jambes arquées
en dedans et les cuisses très courtes, d'une
constitution grasse et leplette, mais l'étant
pâle et maigre, quoiqu'elle parût alors
s'en porter, avoit des douleurs vives
depuis environ douze heures que l'accouchement
étoit absolument préparé. L'enfant se
présentoit dans une bonne situation, le
casque osseux paroissoit un peu allongé —
dans le détroit supérieur du bassin, mais le
quel néanmoins la base du crâne n'apruoit
point encore assez pour former l'élèvement
de la tête, désigné par M. Levret, pour le
quel il a imaginé son forceps, et dont les
avantages s'étendent bien au delà. Mon
confère avoit mis en usage, avec la sage-
femme, tous les moyens que les principes
qu'il a reçus dans l'art des accouchements
lui ont suggérés. Pour aider cette femme
dans son laborieux travail, il essaya, mais
en vain de repousser la tête, pour aller, soit-
disant chercher les pieds. il voulut encore

avant qu'on m'appellât employer le levier de
Roombuisen, qu'il ne pût introduire entre
l'arcade du pubis et l'occipital de l'enfant,
qu'avec bien de la peine pour ne pas réussir.
Je proposai l'application du forceps, dans cette
circonstance, comme un moyen que je croiois
suffisant pour délivrer la femme; mais mon
Confère qui avoit mon arrivée en avoit
fait un monstre à la malade pour l'en
détourner absolument, et par des motifs
honteux, que la prudence est si délicate,
m'empêchant de citer, s'y opposa. il voulut
faire des objections à ma proposition, que
le moindre élève en chirurgie n'auroit pu
accorder avec les règles du sens commun.
ma réplique fut prudente et honnête; et mon
Confère acheva de m'exposer ses doutes sur
l'usage de cet instrument, dans ce cas là, disoit
il, malgré les exemples multipliés qu'il en
a pour les yeux, en ajoutant que la tête de
l'enfant trop grosse ne pourroit être saisie
qu'en déchirant. Je lui représentai que cet
inconvenient n'étoit point à craindre, mais que
la résistance que nous opposerions le diamètre
antérieur du bassin, qui, à peine avoit trois



pouvez, seroit la seule Difficulté qu'il y auroit
à vaincre; qu'après je ne connoissois que ce
moien pour Délivrer la femme, et que si elle
ne vouloit point y consentir, je me retirerois
et laisserois le maître d'opérer, à son égard,
comme il le jugeroit à propos. C'est alors
qu'il parut plus Conciliant, mais en proposant
pour souder avec moi la section de la symphyse,
dont il se chargerait de l'exécution ajouta-t-il
pour le peu que j'y prêtasse la main. J'eus
la force de répondre encore à cette proposition
insensée, en lui remettant sous les yeux les démon-
strations que j'avois faites, pour en faire connoître
le ridicule et le danger, dans mon cours
d'accouchemens des mois de fév. et Mars de
l'année dernière, auquel il avoit assisté pendant
plusieurs leçons; qu'il n'ignoroit par au-
surplus l'expérience que j'avois faite sur la
fille dolté le 27 avril de l'année de son
fils et de son élève; la quelle expérience
étoit plus que suffisante pour imprimer
cette opération aussi dangereuse, qu'incertaine,
et que jamais je n'y prêterois mon
ministère. La Malade qui souffroit
toujours plus résolue en fin à suivre

l'avis que j'avois ouvert. j'introduisis donc le
forceps en sa présence, selon la méthode ordinaire.
J'allai chercher la tête de l'enfant au dessus
du Détroit supérieur du bassin. mais les
contractions de la Matrice étoient si fortes,
si rapprochées et si permanentes, que je ne
pû mettre les branches du forceps dans leur
état de jonction pour extraire l'enfant.
Cependant après plusieurs tentatives je
parvins à son application méthodique
sur la tête de l'enfant; mais après avoir essayé
les différents mouvements combinés et
qui m'ont toujours réussi, je ne pus jamais
en faire l'Extraction. L'embarras dans lequel
se trouve souvent un accoucheur qui raisonne,
devient la mère de l'industrie. Je profitai donc
de cette ressource; et je trouvais dans le forceps
même, un nouveau moyen pour terminer
heureusement un accouchement de cette
difficulté. pour y parvenir, je retirai la
branche du forceps introduite du côté gauche
de la femme; J'eus ferme celle qui restoit au
côté droit; et en portant la pince sur la



base du menton de l'enfant, je la tirai
à moi, pendant qu'avec trois doigts
de la main droite, je repoussai doucement
le Casque osseux vers le côté gauche du
grand bassin. La tête de l'enfant prit alors
une situation oblique, de manière qu'en
présentant l'oreille, la fontanelle se
trouvait appuyée sur la partie supérieure
de l'os sacrum et l'occipital sur la
branche du pubis, du côté gauche. Je
retrai alors la branche du forceps et
j'introduisis l'autre du côté gauche de
la mère. Je portai la concavité sur le
Casque osseux de l'enfant, et à l'aide d'une
forte douleur qui vint à propos,
j'amenai la tête dans le petit bassin,
l'occipital appuyé sur le trou ovulaire
du côté gauche, et la face sur le ligament
sacro-ischiatique du côté droit. Mais
on sent bien que l'accouchement dans
cette position de l'enfant, ne pourroit être
terminé sans une autre manœuvre qui

présentoit des Difficultés ultérieures. —
L'épaule gauche de l'enfant resta accro-
chée sur la Symphondrose Sacro-iliaque
gauche du bassin, et la droite sur l'arcade
du pubis, située un peu latéralement
à droite. Dans cette dernière position,
Je crus devoir toujours employer le forceps
pour achever son extraction. pour y
parvenir définitivement, j'introduisis
la branche droite qui porte la virole,
la première, entre la tubérosité de
Lischium et le coccyx à la gauche de la
mière. Je portai la concavité de sa branche
sur les épaules de l'enfant. J'introduisis
l'autre branche qui reçoit la virole
pour leur jonction: Je la conduisis le
long de la concavité de l'os Sacrum afin
de porter sa force sur la poitrine de
l'enfant un peu obliquement de gauche
à droite. alors j'articulai les deux branches
du forceps que j'arrêtai; et au moyen de
quelques secousses de droite à gauche,
en tirant en avant les épaules, elles



glissoient un peu latéralement dans le
grand diamètre du bassin. De cette manière
jus la satisfaction en présence de mon
confrère, de délivrer la femme d'un enfant
mâle bien vivant, avec une tête prodigieusement
grosse et dont les proportions excédoient
de beaucoup celles du plus gros enfant
possible. La mère n'a pas eue la
moindre incommodité de cet accouchement
laborieux terminé heureusement par ce
nouveau procédé opératoire.

On demande encore à M. Sigault
quel fruit il auroit put tirer de la section
de la symphyse des os pubis dans cette
occurrence, ou l'enfant ne pût être
retourné ny extrait par le forceps,
qui le rapporte d'ailleurs sur l'ampliation
que l'opération Sigaultienne peut donner
au bassin. Le volume considérable
de la tête de cet enfant et ses épaules
très larges ne permettoient point un
accouchement facile, surtout dans un
bassin mal conformed et dont le diamètre

antérieur avoit tout au plus trois pouds.
il falloit donc une combinaison juste entre
les différents diamètres de la tête de
l'enfant et ceux du bassin, pour pouvoir
terminer sans accidens cet accouchement
laborieux; et il ne falloit pas moins
pour y contribuer, quoiqu'avec difficulté,
le secours qu'offre le forceps Courbe, et
sçavoir l'appliquer dans les différents sens
combinés avec les positions de la tête et
du corps, sur les différents points du
bassin.

Mais C'est aux travaux assidus et éclairés
de l'Académie Royale de Chirurgie,
aidés d'observations pratiques que les
chirurgiens accoucheurs Zélés pour le
progrès de l'art, lui offrent continuellement
qu'on doit attendre la vraie perfection
de cette branche de l'art tant essentielle
à la conservation des Citoyens, comme
celle de toutes les autres parties qui
constituent l'art de guérir.



№ 1 мкс в архиве